Dr Andrew Moulden: “Svaka vakcina proizvodi štetu”

John P. Thomas

April, 2015

Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm



DrAndrewMoulden.com

1963.11.12 ~ 2013.11.04

Dr. Andrew Moulden: “Svaka vakcina proizvodi štetu”

John P. Thomas

April, 2015

Prijevod i obrada: Almin Nezirević



1 DIO

Jeste li Vi ili Vaša djeca oštećeni vakcinama?

Siguran sam da ste svi čuli kakav zvuk šalje beba kada plače. Obični plač, često poziv upozorenja, možda joj treba promijeniti pelene, ili je gladna, ili treba da podrigne, ili traži vašu pažnju da je mazite I tome slično. Postoji drugačija vrsta plača koji proizvode bebe danas, koji je prilično različit od navedenog. Možda niste čuli takav plač, ili ako jeste, možda ga niste prepoznali. Ova vrsta plača je ekstremno izražen plač, praćen vriskom. Ovaj plač je oštar i prodoran, piskav krik sa vriskom, koji zvuči kao da bebi sječete utrobu nožem, ili gulite kožu sa njenog tijela. Ovo nije normalan plač koji traži roditeljsku pažnju, ovo je molba za zaštitu i izbavljenje od zlokobne prijetnje. Ovaj vrisak (krik) je zvuk nekontrolisanog terora i boli. Uzrok je obično štetna reakcija na vakcinu. Jednom kada čujete ovu vrstu plača, vriska, vaše srce više

nikada neće biti isto, jer ste uvidjeli da je nešto strašno pogrešno i ne možete ga popraviti sa zamjenom pelena ili davanjem mlijeka.
Djeca su u navjećem riziku od šteta uzrokovanih vakcinama, jer će im biti dato u prosjeku 69 doza vakcina do 18 godine starosti.

Reakcije na vackine nisu normalan dio života

Postoji mnogo znakova štetnih efekata koje proizvode vakcine, ali sve dok ne naučite prepoznati ih, lahko ćete preći preko toga, ili pretpostaviti da su današnja djeca jednostavno takva. Roditeljima su govorili da će djeca jednostavno prevazići, odrastanjem, ove simptome, odnosno štetne efekte na vakcine i da ništa ne brinu. Moje srce se slama kada vidim četverogodišnju djecu koja nisu ovo prevazišla ili kako kažu odrasla. Posmatrao sam mnogo mlade djece između 3 i 5 godina koji još ne mogu sastaviti riječi zajedno i izgovoriti smislenu rečenicu. Njihov izgovor riječi je tako nerazgovjetan da niko, čak ni njihove majke ne mogu shvatiti šta govore. Oni su vjerovatno negdje u spektru autizma, ali im još nije postavljena dijagnoza autizma. Stopa autizma je ranije bila, u odnosu 1:10000 (1 autistično dijete na 10000 djece). Danas je to u omjeru 1:50 (1 autistično dijete na svako 50-to dijete). Poremećaj pažnje, hiperaktivnost i poteškoće pri učenju su tako česti da većina roditelja smatra da je to sve normalno. Stanja ko što su alergije, astma, ekcem, napadi (epilepsija) su bili rijetki prije 50 godina. Ova stanja i mnoga druga nisu normalan dio odrastanja djece i njihovog razvoja. Ali su nam rekli I povjerovali smo da je to sve “normalno”. Međutim, nije tako bilo!

Bili smo zdraviji bez vakcina

Prije 50 godina škole nisu imale “besplatne apoteke” lijekova, jer djeca nisu trebala lijekove. Nikome nije trebao ritalin – droga (lijek) za poremećaj pažnje, jer smo bili sposobni da sjedimo i budemo fokusirani na zadatke. To je bilo doba kada je bilo veoma malo “lijekova” namijenjenih djeci, i bio je vrlo mali broj vakcina. To je bilo doba kada su dječije bolesti bile dio odrastanja. To je bilo vrijeme kada je naš imuni sistem bivao jači sa svakom dobijenom dječijom bolesti.

Upotreba vakcina je postala način života za većinu Amerikanaca

Stvari su se mnogo promijenile 1960-ih godina. Standardna briga (zdravstvena zaštita) sada u Americi uključuje vrlo agresivan program vakcinacije u prvih 6 godina života. Prva vakcina se daje u 12 sati nakon rođenja (vakcina protiv hepatitisa B). Većina vakcina se daje grupno – zajedno tokom iste posjete doktoru, i to u periodu 2, 4, ili 6 mjeseci nakon rođenja.



Nema sumnje da vakcine uzrokuju štetu i oštećenja našem tijelu. Ustvari one uzrokuju toliko mnogo štete da su farmaceutske kompanije zaprijetile da će prestati proizvoditi vakcine sve dok ima američka vlada ne dadne osiguranje protiv optužbi (i suđenja) za štetne efekte vakcina. 1986. godine američka vlada je popustila pod ovim prijetnjama i donijela nacionalni akt o povredama koje uzrokuju vakcine kod djece. Sada imamo federalni program, sud za vakcine koji razmatra slučajeve potencijalnih šteta od vakcina i osigurava naknadu u novcu za štete koje ulaze u ovu kategoriju povreda uzrokovanih vakcinama. Novčane naknade se isplaćuju od postotka svake doze vakcine na tržištu (određeni procenat), koja se plasira na tržište. Proizvođači vakcina nemaju nikakvu odgovornost, ne priznaju da prouzrokuju štetu, i nastavljaju proizvoditi i uvoditi nove vakcine bez ikakve brige o finansijskoj odgovornosti za živote koje su uništili svojim proizvodima.

Stanje vašeg djeteta je samo slučajnost

Jedan od najvećih problema povezan sa vakcinama je upotreba riječi "slučajnost." Ako vaše dijete nakon primljene vakcine postane uzrujano ili dobije visoku tjelesnu temperaturu, doktor (pedijatar) će vam reći da to nije povezano sa vakcinom. Reći će vam da je to "slučajnost" i da idete kući, da će to proći. Riječi "slučajnost" ili "nepovezanost" sa vakcinama je medicnski žargon da vam kažu "hajde da ne pričamo o štetnim, odnosno neželjenim, reakcijama na vakcine, sve će biti u redu, idite kući i proći će." Za hiljade djece reakcije na vakcine ne prođu. Oni ne izađu iz toga. Njihov razvoj je zaustavljen i krene prema nazad. Oni gube sposobnost izgovora cijelih rečenica. Neki izgube svu verbalnu komunikaciju. Neki prestanu hodati i vraćaju se u pelene. Neki imaju stalne napade i grčeve, ponavljajuće ponašanje, povrijeđuju sami sebe, nasilne izlive bijesa i ljutnje, nekontrolisanu hiperaktivnost, nemogućnost da nauče bilo šta novog, nemogućnost da jedu ili probave hranu itd… Neki odjednom (naprasno) umru od zastoja disanja (otkazivanje centra za kontrolu disanja u mozgu). Neki nastave dobijati progresivno propadanje tijela i oštećenja dok ne padnu u komu i onda umru.

Postoje doktori koji su spremni reći "sačekajte malo"

Postoje doktori koji su voljni reći "sačekajte malo" ove vakcine su opasne. Jedna od njih je i dr. Suzanne Humprihes i mnogi drugi.

Moj cilj je pomoći prepoznati štetne reakcije na vakcine koje pogađaju djecu i odrasle. Postoji mogućnost da osoba ima srednje tešku reakciju na vakcinu, i sljedeća doza vakcine koju primi je gurne u ambis invalidnosti i oboljenja. Ovo se dešava zato što je šteta od vakcina *kumulativna*. Svaka naredna vakcina pravi veću štetu od prethodne.

Šteta uzrokovana vakcinama možda neće biti primiješena u ranoj fazi



Česta je pojava da djeca i odrasli mogu imati štetne efekte od vakcina, bez da iko prepozna tu situaciju, a koja može ugroziti život. Rezultat toga je, da davanjem sve većeg broja vakcina dođemo do tačke u zdravlju beba, djece, tinejdžera i odraslih gdje postanu teško oštećeni, nepokretni ili umru. Štetni efekti vakcinacije mogu oštetiti imuni sistem, uzrokovati oštećenje mozga, paralizu, i doprinijeti pojavi nekolicine drugih modernih hroničnih bolesti. Zajednica oštećenih vakcinama je sastavljena od ljudi, starih i mladih, koji pate od spektra hroničnih bolesti i invaliditeta, uključujući poteškoće pri učenju i zaostalost u

razvoju, poremećaj pažnje, autizam, epileptični poremećaji, mentalna retardacija, dijabetes, astma, bolest zapaljenja crijeva, reumatoidni artritis, multipla skleroza i ostale neurodegenerativne i autoimune bolesti i poremećaje. Govorimo o životima stvarnih živih ljudi, ne statistikama! Odrasli nastavljaju da pate od oštećenja koja su dobili vakcinacijom u djetinjstvu. Novorođenčad umiru nakon što dobiju sedam vakcina u jednom danu. Hiljade američkih vojnika postaju invalidi poslije dobijanja jedne ili više antraks vakcine. Ljudi koji borave u bolničkim njegama mogu postati osakaćeni od vakcine protiv gripa, ili mogu umrijeti od upale pluća koja počinje odmah nakon primljene vakcine protiv gripa. Sve ovo predstavlja stvarnu patnju, i stvarnu štetu.

Posao vakcina je posao straha

Postoji nekoliko web Internet stranica napravljenih da nam kažu sve strašne stvari koje će nam se desiti ako ne primimo sve dostupne vakcine. Razlog za primanje svake vakcine je pažljivo objašnjen. Ono što nam nije rečeno, je da uzimanje vakcina može izazvati strašne simptome i može uzrokovati smrt, nekada mnogo češće nego sama bolest, protiv koje se vakcinišemo, jer vakcine zapravo izazivaju bolesti za koje su napravljene da ih spriječe. Za druge ljude, različite supstance u vakcinama kao konzervansi, ađuvanti i emulgatori mogu učiniti čak i veću štetu nego bakterije i virusi koji su u vakcinama. Također smo podvrgnuti pritisku od medicinskog sistema da smo sigurno mi i naša djeca primili sve vakcine. Rečeno nam je da ako ovo ne uradimo

izložićemo cijeli zemlju u opanost. Jedini put da svi budemo sigurni je da se svi vakcinišu. Oni koji prigovore ovome nazivaju se glupim, sebičnim, nemarnim, nepoželjnim i neučtivim. Oni kažu da niko nema pravo da ugrožava sigurnost ostalih odbijanjem da primi vakcine.

Prepoznavanje štetnih efekata vakcina

Mnogi od vas koji ovo čitate su već prestali primati vakcine, jer ste ubijeđeni da je potencijalna šteta mnogo veća od moguće koristi. Ako ih još uvijek primate, one mogu biti dio problema vašeg trenutnog zdravlja. Kombinacija prethodnih vakcina koje ste dobili, sa trenutnim izazovima za vaš imuni sistem i nervni sistem, može proizvesti ozbiljne bolesti. Ako možete da primijetite potencijalne štetne reakcije na vakcine u vašoj porodici i bližnjima, ili među prijateljima, možete ih upozoriti na to, i to im može spasiti život. Pogledajmo neke korake koje možda želite preduzeti da bi pratili zdravlje vaše djece, vaše lično zdravlje, kao I zdravlje vaše porodice i prijatelja. Nacionalni informacioni centar za vakcine pruža nam slijedeće informacije, koje nam mogu pomoći da budemo svjesni štetnih efekata vakcina. Oni kažu: “Ako vi ili vaše dijete doživi bilo koji od simptoma koji su navedeni, u satima, danima ili sedmicama nakon vakcinacije, trebate o tome obavijestiti nadležne organe i institucije.” Ovo su neki do simptoma štetnih efekata na vakcine:

- Izražen otok, crvenilo, toplota ili tvrdnoća mjesta gdje je data injekcija;

- Osip po tijelu (koprivnjača);
- Šok – kolaps;
- Stalan plač satima i jak vrisak;
- Ekstremna pospanost ili dugi period nesvjesnog stanja;
- Grčenje ili trzanje tijela, ruku, nogu ili glave;
- Ukrštanje očiju;
- Slabost ili paraliza bilo kojeg dijela tijela;
- Gubitak sposobnosti ustajanja ili sjedenja, prevrtanja;
- Gubitak kontakta očima;
- Gubitak svijesti i društveno povlačenje – socijalna izolacija;
- Visoka tjelesna temperatura, gubitak sluha i vida;
- Bolovi u zglobovima ili slabost mišića;
- Poremećaji spavanja;
- Udaranje glavom, ili napadi ponavljajućih pokreta (pljeskanje, trljanje, ljuljanje);
- Nemir, hiperaktivnost ili nemogućnost koncentracije;
- Umor i slabost;
- Gubitak memorije;
- Napad hroničnih infekcija uha ili pluća;
- Hronični zatvor ili uporan i žestok proliv;
- Problemi sa disanjem (astma);
- Anemija i prekomjerno krvarenje

Nastavak sa vakcinacijom nakon pojave ozbiljnog ugrožavanja zdravlja, može dovesti do još većih oštećenja ili smrti.

Šta uzrokuje štetne efekte vakcina?



Vakcine su kompleksna kombinacija štetnih supstanci koje su dizajnirane tako da uzrokuju stresnu reakciju u tijelu. Nadamo se da će reakcija uzrokovati promjene imunog sistema, koje će zaštititi osobu od infekcije sa bolestima u društvu. Kao rezultat, štetne reakcije na vakcine mogu biti uzrokovane bilo kojom komponentom u vakcini, ili kombinacijom komponenti. Neki kažu da su štetni efekti uzrokovani bakterijama ili virusima (bilo živim ili umrtvljenim) koji su u vakcinama. Neki kažu da je to živa, konzervans u vakcini tzv. thimerosal, koja izaziva oštećenja. Živa je povezana sa širokim brojem neuroloških bolesti, sa potiskivanjem odnosno slabljenjem imunog sistema, i pogoršanjem sistema za varenje. Drugi kažu da je polysorbate 80 ono što uzrokuje oštećenja, a nalazi se u vakcini, koji se koristi kao emulgator i kao medijum za prijenos druge supstance u vakcini. Pokazalo se da izaziva

rak i neplodnost. Drugi su ubijeđeni da je oštećenja uzrokovao aluminijum, koji je ađuvant, dodatak vakcini da stimuliše imuni sistem i njegov odgovor na bakterije i viruse u vakcini. Aluminijum je otrov koji može izazvati degeneraciju kostiju, koštane srži i mozga. Aluminijum smanjuje negativni električni naboj u krvi (zeta potencijal), što dovodi do grušanja (zgrušavanja) krvnih ćelija u krvi, kada pokušavaju pri protoku kroz krv da prođu kroz vrlo sitne sudove kapilarne mreže. Formaldehid (tečnost za balzamovanje) se koristi u vakcinama da ubije žive viruse i bakterije. On je karcinogen (izaziva rak). Vakcine sadrže i mikoplazmu, koja je sitni infektivni agent i koja može napasti ćelije i oštetiti mitohondrijalnu aktivnost. Svi ovi faktori mogu izazvati reakcije u tijelu, i proizvesti teške i onesposobljavajuće bolesti, čak i smrt. Dodajmo ovome svemu mnoštvo drugih faktora iz okoliša, vode, zraka, hrane. U vodi možemo naći ostatke hlora, fluora i druge hemijske otrove. Dodajmo i ostale lijekove (droge), pogotovo one sa opasnim crnim upozorenjima na kutijama. Mi ne znamo ko će biti oštećen vakcinama i koliko opasno će to oštećenje biti. Mi ne znamo ni kada će se to desiti. Svaka osoba različito reaguje.

Koji su neki od prvih upozoravajućih znakova oštećenja nastalih od vakcina?

Postoji niz ranih upozoravajućih znakova koji se provlače kao neprimjećeni, jer ne uzrokuju disfunkcije ili bol. Ovi znakovi su prepoznati (identifikovani) od strane dr. Andrew Moulden-a početkom

21. stoljeća. Dr. Moulden je bio stručnjak za otkrivanje nastalih oštećenja mozga. Posvetio se proučavanju promjena u ponašanju nervnog sistema povezanog sa imunim sistemom, heperstimulacijom imunog sistema, poremećajima razvoja nervnog sistema, i na kraju objašnjenju kako vakcinacija može biti zajednički okidač za nekoliko oštećenja mozga i ponašanja. Dr. Moulden je umro u novembru 2013. godine (2 sedmice prije objave saznanja o vakcinama i šteti koju uzrokuju). Dr. Moulden je zapazio određene kliničke indikatore udara (moždanog) u djece i odraslih poslije primanja vakcina. Bebe koje su imale potpuno simetrične (jednake) karakteristike lica, odjednom su dobile, razvile asimetrične (nejednake) karakteristike lica, a koje su bile istog tipa promjena kao i kod odraslih osoba koje dožive moždani udar. Udar je uzrokovan smanjenim, odnostno oštećenim protokom krvi do dijela mozga, koji lišava ćelije kisikom i one odumiru. Dr. Moulden je primjetio da se normalan položaj očiju (ravan pogled) mijenja kod onih koji prime vakcine, nakon vakcinacije. Odjednom, jedno od očiju se okrene lagano unutra ili ponekad vani kada ga uporedimo sa drugim normalnim okom. On je primjetio da jedan ugao usta padne prema dolje kada se osoba nasmije. Ovo se dešava zbog gubitka mišićnog tonusa u području obraza gdje je najbliži nosu i gornjoj usni. Ponekad ove promjene budu privremene i prolazne, a nekada trajne odnosno doživotne. Zbog poznavanja fiziologije mozga i njegovih oštećenja dr. Moulden je znao da su ovi vizuelni znaci, znaci tzv. malih (mini) moždanih udara, koji su povezani sa oštećenjima specifičnih kranijalnih nerava u mozgu. Ovi nervi kontrolišu mišiće lica. Ljudi možda nisu bili ni svjesni da su imali mini moždani udar, zato što mozak nema odgovor u

osjećaju boli na oštećeni (smanjeni) protok krvi, pa ipak njihov mozak je oštećen. Zgrušavanje krvi kao uzrok moždanog udara dešava se u najmanjim krvnim sudovima – mikrokapilarima u tijelu, koji su previše mali da bi bili vidljivi na snimcima (skenerima). Kada se krv zgruša, ona ne može glatko da teče kroz kapilare. U osnovi protok krvi stane, i ćelije u pogođenom ppdručju počinju umirati uslijed nedostatka kisika. Ovo se dešava u područjima koja se zovu kapilarne mreže (korita), koja su najmanji krvni sudovi u krvnom sistemu. Oni su tako mali da se crvene krvne ćelije (zrnca) moraju progurati ili stisnuti kroz pojedinačne sudove da bi prošli kroz njih. U nekim slučajevima jedno oko će se fokusirati u laganom gornjem pravcu, što uzrokuje da osoba nagne glavu da izjednači nivo fokusa pri pogledu. Također može doći do lagane asimetrije u pogledu pokretanja očnih kapaka, koje može biti vidljivo sa ultra sporim video prikazom. Očni kapci se otvaraju i zatvaraju u savršenoj harmoniji. Kada se dese mini moždani udari, očni kapci će se otvarati i zatvarati u lagano različitom tempu. Ovo ne možemo vidjeti golim okom, jer kapci trepću jako brzo. Ako se oštećenje protoka krvi desi u području mozga koji kontroliše disanje, disanje može biti poremećeno, i u nekim slučajevima može biti potpuno zaustavljeno. Ako se ovo desi, onda nastupa iznenadna smrt prestankom disanja. Tehničko ime za ovo stanje, odnosno ove mini moždane udare je „Transient Ishemic Attack“ (TIA) – nestalni ishemijski udar. TIA (udar) se može desiti bilo gdje u tijelu gdje su smješteni vrlo sitni kapilarni sudovi. Kada se desi u mozgu, onda se dokaz udara može vidjeti na izrazu lica.

U intervju koji je dao 2009. godine u vezi sa oštećenjima od vakcina dr. Moulden je iznio nekoliko zapažanja:

„Naučne metode, pravljene i analizirane, mogu isto tako sakriti istinu, kao što je mogu otkriti, ili pak napraviti (kreirati) istinu.“

„Nauka ne može zamijeniti alate koje nam je Bog dao, a to su zdrav razum i zapažanje koje svi imamo. Ne trebaju vam statistički matematički modeli, od eksperata, da odbijete (negirate) ono što vidite svojim očima.“

„Kao ljekar moja je zakleta dužnost da ne prouzrokujem štetu. Kao ljudsko biće moja je dužnost da brinem o bližnjima. Kao učitelj, moja je odgovornost da učim svjesnosti i razumijevanju. Kao naučnik, moja je dužnost da razdvojim uzrok od slučajnosti. Kao kršćanin moja je vrijednost postupati prema drugima, kako bih želio da drugi postupaju prema meni. Kao čovjek, moja je odgovornost da izdržim i stanem uz istinu i razumijevanje, kada oni koji imaju vlast pogriješe.“

„Sve vakcine uzrokuju oštećenja mozga, bolesti, hronična oboljenja, starenje i smrt – istina govori sama za sebe. Ako ne tražite, ako ne kucate, ako ne gledate, ako vjerujete svojim vlastitim shvatanjima i onome što vam govore, onda ste siguran kupac vakcina.“

Zapažanje ranih, prvih upozoravajućih znakova oštećenja od vakcina

Ako počnete svakodnevno pažljivo posmatrati lica djece i odraslih, početi ćete viđati iste znakove koje je dr. Moulden opisao. Kod članova porodice i bližnjih, možete uporediti njihov sadašnji izgled lica sa slikama koje su imali ranije, odnosno prije primanja vakcina.



Najmlađi su najviše izloženi riziku, jer primaju visok broj doza vakcina. Ali i kod odraslih šteta je vidljiva i očigledna. Demencija je dostigla nivo epidemije. Ne uzrokuje starenje demenciju.

Spriječavanje oštećenja mozga i ostalih organa

Najbolji način je izbjegavati vakcinisanje. Kada ovome dodamo pijenje čiste vode, udisanje čistog vazduha, konzumiranje organske integralne hrane (sirovo voće i povrće, žitarice i slično), onda smanjujemo rizik od dobijanja modernih bolesti.

Liječenje oštećenja koje su uzrokovale vakcine

Dr. Andrew Moulden je bio ubijeđen da se mozak koji je oštećen vakcinama može oporaviti – izliječiti. Jer, iako je šteta zahvatila određene strukture mozga, mozak ima sposobnost da uspostavi nove neurološke veze na različite načine.

Prilagođavanje budućih medicinskih prioriteta

„Mi, doktori, vam prodajemo vakcine za profit, koje uzrokuju bolesti, poremećaje i smrt. Onda vam prodajemo farmaceutske proizvode koji tretiraju simptome za profit, a za tretman oštećenja i nepravilnosti koje smo mi uzrokovali (izazvali)“ (Dr. Andrew Moulden)

„Sve vakcine uzrokuju TIHO oštećenje mozga i organa na potpuno isti način kako i divlji polio virus uzrokuje paralizu i respiratorni otkaz, i kako druge infektivne nesreće, od prošlih dana, paralizuju, sakate i ubijaju. Ovo je sada dokazano. Oštećenja su kumulativna (svako naredno je gore od prethodnog) sa svakom datom vakcinom. Oštećenja organa, tkiva i mozga su bila klinički tiha – sve do sada!“ (Dr. Andrew Moulden)

Bilješke:

1] "2014 Recommended Immunizations for Children from Birth Through 6 Years Old," Centers for Disease Control, PDF document retrieved11/20/2014. http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs.pdf

[2] "Back to School Vaccines: Risks & Failures," Barbara Loe Fisher, National Vaccine Information Center Newsletter, Retrieved 11/24/2014. http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/August-2014/Back-to-School-Vaccines–Know-the-Risks-and-Failur.aspx

[3] "The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986," National Vaccine Information Center, Retrieved 11/24/2014. http://www.nvic.org/CMSTemplates/NVIC/pdf/NVIC-ASK-8-Questions.pdf

[4] "Etiology of Autism/Vaccine Damage/CHILD v. HHS – AutismPedia," Retrieved 11/24/2014. http://www.autismpedia.org/wiki/index.php?title=Etiology_of_Autism%2FVaccine_Damage%2FCHILD_v._HHS

[5] "Baby M's Parents-Vaccine Death Forensics Report," Vaccine Facts VacFacts.com, Retrieved 11/24/2014. http://www.vacfacts.info/baby-ms-parents-vaccine-death-forensics-report.htm

[6] Medical Veritas, the Journal of Truth in Health Science, list of contributing authors. http://www.medicalveritas.org/MedicalVeritas/Volume_7%3B_Number_2_January,_2011.html

[7] "My message to all parents re vaccination," Viera Scheibner PhD, Retrieved 11/24/2014. http://vierascheibner.com/index.php?view=article&catid=65%3Ageneral-a-miscellaneous&id=81%3Amy-message&option=com_content&Itemid=60

[8] "What You Were Never Told About Vaccines," Interview with Dr. Andrew Moulden, July 21, 2014, Retrieved 11/24/2014. http://vactruth.com/2009/07/21/dr-andrew-moulden-interview-what-you-were-never-told-about-vaccines/

[9] "Many Parents Are Now Aware of Dangerous Vaccine Side Effects," Barbara Loe Fisher, Mercola.com, November 1, 2011. 120 http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/11/01/more-parents-waking-up-to-vaccine-dangers.aspx

[10] "Vaccine Resources," National Vaccine Information Center. http://www.nvic.org/resource-center.aspx

[11] "U.S. Government Says Vaccines are Dangerous," Mercola.com, September 27, 2011. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/09/27/vaccines-are-dangerous-says-the-government.aspx

[12] “Vaccinations are causing impaired blood flow (Ischemia), Chronic Illness, Disease and Death for us all,” Dr. Andrew Moulden, VacTruth.com, Retrieved 11/24/2014. http://vactruth.com/2009/08/03/vaccinations-are-causing-impaired-blood-flow-ischemia-chronic-illness-disease-and-death-for-us-all-hp/

[13] “International Memorial for Vaccine Victims,” National Vaccine Information Center, Retrieved 11/19/2014. http://www.nvic.org/Vaccine-Memorial.aspx

[14] “Dr. Offit Wants to Eliminate Religious and Philosophical Vaccine Exemptions,” Health Impact News, October 7, 2014. http://healthimpactnews.com/2014/dr-offit-wants-to-eliminate-religious-and-philosophical-vaccine-exemptions/

[15] “Ask 8 Questions,” National Vaccine Information Center, Retrieved 11/19/2014. http://www.nvic.org/Ask-Eight-Questions.aspx

[16] “What You Were Never Told About Vaccines,” VacTruth.com, Interview with Dr. Andrew Moulden from July 21, 2009, Published October 8, 2009, Retrieved 11/20/2014. http://vactruth.com/2009/07/21/dr-andrew-moulden-interview-what-you-were-never-told-about-vaccines/

[17] “Vaccinations are causing impaired blood flow (Ischemia), Chronic Illness, Disease and Death for us all,” Dr. Andrew Moulden, VacTruth.com, Retrieved 11/24/2014. http://vactruth.com/2009/08/03/vaccinations-are-causing-impaired-blood-flow-ischemia-chronic-illness-disease-and-death-for-us-all-hp

2 DIO

Dr. Andrew Moulden: Svaka vakcina nanosi štetu

Dr. Moulden – potraga za životom i istinom

Kanadski ljekar Dr. Andrew Moulden iznio je jasne naučne dokaze da dokaže da svaka vakcina (svaka doza pojedinačno) data djetetu ili odraslima proizvodi štetu. Istina koju je on otkrio je odbijena od konvencionalne medicine i farmaceutske industrije. Ipak njegovo upozorenje i poruka Americi i svijetu ostaje kao jako naslijeđe čovjeka koji je ustao protiv farmaceutske industrije, i njenog programa da vakciniše svaku osobu na zemlji. Nakon njegove smrti, njegova reputacija biva ponižena, i njegova poruka upozorenja i nade biva iskrivljena i zakopana bez spomena. Dr. Moulden kaže: „Ono što smo mi uradili jedni drugima (sa vakcinama) je napravilo najdublju štetu koju je ljudski rod uradio ljudskom rodu u historiji čovječanstva.“ Razlog zbog kojeg smo dospijeli ovdje gdje smo je zbog:

- Naše arogancije u razmišljanju da mi znamo sve. U fiziologiji i medicini mi ne znamo sve.
- Naša pohlepa da unprijedimo naše sebične interese za zaradom, da prodamo proizvode i unaprijedimo korporativne interese

Kredibilitet Dr. Andrew Moulden-a

Je li dr. Moulden bio luđak kako neki tvrde, ili je bio briljantan ljekar i istraživač? Kada analiziram rejting ljudi koji su mi nepoznati, analiziram sljedeće: da li ta osoba iznosi samo svoje mišljenje ili to može potkrijepiti sa validnim dokazom? Da li ima obrazovnu akreditaciju? Postoje li drugi ljekari i naučnici koji podržavaju njeno mišljenje i preporuke? Je li osoba kontrolisana od farmaceutske industrije i alopatske medicinske asocijacije ili FDA (agencije za hranu i lijekove)?
I konačno, šta šarlatani i njihovi prijatelji imaju reći o toj osobi?
Dr. Moulden je bio doktor u kliničkoj psihologiji i neuropsihologiji. Imao je stepen magistra u oblasti razvoja djece, i bio je doktor medicine. Njegov rad je bio poštovan od drugih istraživača koji nisu marširali sa bubnjevima farmaceutskih kompanija. Dr. Moulden je bio prijetnja farmaceutskoj industriji, i njenoj familiji šarlatana, koji su ga na čak 21 internet stranici tretirali kao neprijatelja. Dr. Moulden je dao ostavku na mjestu doktora medicinske prakse 2007. godine, da bi putovao kroz Sjevernu Ameriku i prenosio poruku, da svaka doza bilo koje i svakog tipa vakcine uzrokuje štetu onima koji je prime. Tih godina, on je pokazao da su mnogi slučajevi “sindroma trešenja djeteta” bili ustvari oštećenja i štete uzrokovane vakcinama. Njegove izjave i svjedočenja su oslobodile mnoge roditelje od lažnih optužbi da su zlostavljali svoju djecu.

Povlačenje iz javnosti – napadi i prijetnje smrću

2010. godine dr. Moulden je nestao iz javnosti. I prije povlačenja iz javnosti, grupa profesionalnih „ubica“ je dobila zadatak da uništi njegov ugled u svakom smislu. Objavljivali su laži i obmane na internetu i uradili sve moguće da ga diskredituju i sruše. Nakon što se povukao iz javnosti, njegove internet stranice su hakovane, i pristup njegovom učenju je uveliko uništen. Da, bilo je i prijetnji smrću.

Misteriozna smrt dr. Andrew Moulden-a

Smrt Andrew Moulden-a je prekrivena misterijom. Neki izvori kažu da je imao srčani udar, a drugi kažu da je izvršio samoubistvo. Kolega dr. Moulden-a koji je želio ostati anoniman, izvijestio je za jednu radijsku emisiju „novosti o zdravlju“, da je imao kontakt sa njim 2 sedmice prije njegove smrti 2013.g. Dr. Moulden je izjavio našem izvoru i malom broju bliskih kolega u oktobru 2013. da će on prekinuti svoju šutnju i objaviti nove informacije do kojih je došao, i da će te informacije biti najveći izazov za vakcinalni biznis i farmaceutsku industriju. Bio je spreman da se vrati. Iako se bio povukao u tišinu, nikad nije prestao sa svojim istraživanjem. Međutim, potom, 2 sedmice kasnije dr. Moulden je odjednom mrtav!

Prijetnje smrću protiv kritičara vakcina nisu neobične

U drugom slučaju zataškavanja štetnosti vakcina, dr. Garth Nicolson je dobio prijetnje smrću. On je bio dio istraživačkog tima koji su postali svjesni testiranja, i biološkog ratovanja (tajnog oružja) koje se provodilo nad zatvorenicima u Teksasu. Agenti odnosno supstance biološkog oružja kasnije su pronađene u vakcinama koje su davane vojnicima američke vojske tokom zaljevskog rata (Gulf War). Rezultat je bio hiljade oboljelih od tzv. Gulf War sindroma i smrti uzrokovanih vakcinama.

Dr. Nicolson kaže: „Mi smo bili ustvari prisiljeni napustiti Teksas, jer je postalo previše opasno. Nekoliko mojih kolega je umrlo. Moj šef je upucan u potiljak glave u svom uredu, zato što se spremao izjaviti šta se dešava u eksperimentima u Teksasu. Postalo je veoma opasno.“

Čuvanje naslijeđa dr. Moulden-a

Snage koje žele suzbiti rad dr. Moulden-a su uradile dobar posao u brisanju većine informacija koje su bile dostupne na internetu. Prije nego sve to nestane, sabrao sam neke od njegovih učenja. Dostupno je predavanje na youtube.com u trajanju od 6 sati koje se zove „Tolerance lost“ gdje možete čuti i vidjeti slike ljudi, djece i ratnih veterana, koji su oštećeni vakcinama (dokaze možete vidjeti na njihovim licima i drugim dijelovima tijela). Dr. Moulden-ovo učenje se fokusiralo na rad mozga, i na psihološke kao i aspekte ponašanja kod povreda mozga. On je

mogao vidjeti (na osnovu znanja kojeg je posjedovao) ono što drugi nisu.

Dr. Moulden nije mogao ignorirati činjenicu da su vakcine najveća prijetnja po zdravlje ljudi

Vakcine su najveća prijetnja po zdravlje ljudi u 20 i 21 vijeku. Dr. Moulden ovo nije mogao ignorirati, jer je to bilo očito, i gledalo ga ravno u oči, kada je gledao u lica svojih pacijenata. Mogao je vidjeti tragove oštećenih kranijalnih nerava uzrokovanih vakcinama, kada je posmatrao izobličene izraze lica, i pokrete očiju onih koji su bili izloženi vakcinisanju.

Oštećenje vakcinama ne proizvodi samo jedan/pojedinačan simptom


Simptomi oštećenja koji nastaju upotrebom vakcina su mnogobrojni i variraju. Štaviše, štetni efekti vakcina se mogu ispoljiti odmah, kratko nakon primanja vakcine, ili se mogu desiti godinama kasnije. Često, reakcije jedino bivaju vidljive poslije davanja mnogo doza različitih vakcina. *Ova različitost u reakcijama i nepredvidivost vremenskog intervala reakcija, daju kontrolu nad statistikama farmaceutskoj industriji i medicini, tvrdeći da vackine ne uzrokuju štetu.* Ako ne vide veliki broj štetnih efekata u kratkom vremenskom periodu, oni zaključuju da štete i nema. Rečeno nam je da su vakcine tako sigurne,

da dijete može primiti čak 10000 vakcina (deset hiljada) bez štetnih efekata! Iako, farmaceutska industrija nikada nije uradila nijednu studiju u periodu od 20 godina, samo da utvrdi šta se dešava djeci koja prime 69 ili više doza vakcina tokom prvih 18 godina života. To nikada neće ni uraditi jer će šteta uzrokovana vakcinama biti otkrivena! A ta šteta su bolesti, sakaćenja i smrt. Dr. Moulden je bio ubijeđen bez ikakve sumnje da vakcine čine štetu. Jer je vidio osakaćene ljude, doživotnju patnju i prijevremenu smrt.

Primarni mehanizmi u vakcinama koji uzrokuju štetu u našem tijelu

Dr. Andrew Moulden je identifikovao dva primarna mehanizma odnosno komponente, koji objašnjavaju kako vakcine prouzrokuju štetu tijelu.

To su tzv. **M.A.S.S. i ZETA POTENCIJAL**. Šteta po ljudsko zdravlje koju uzrokuju vakcine, i ostali toksini, miješa se sa normalnim protokom krvi i pokreće jaku, čak ekstremnu, reakciju imunog sistema. Rezultat je lišavanje, nedostatak opskrbe kisika na tzv. mikrovaskularnom odnosno kapilarnom nivou. Kapilari su najmanji krvi sudovi u tijelu. Ljudsko tijelo ima oko 600 000 milja kapilara (oko 960 000 kilometara). Kada je protok krvi zaustavljen i kisik nedostupan ćelijama, dolazi do oštećenja ćelija, tkiva i tijela. Kada se ovo desi u mozgu i digestivnom (probavnom) sistemu, razvijaju se autizam i druge neurodegenerativne i mentalne bolesti.



Akronim M.A.S.S. znači sljedeće:
M – Moulden – označava dr. Moulden-a koji je razvio principe koji objašnjavaju anoxia spectrum sindrom (spektar sindroma izazvanih anoksijom odnosno nedostakom kisika i krvi i tijelu).
A – Anoxia je stanje gdje je dostupnost kisika grupi ćelija ili organu nedostupna. Anoxia je rezultat smanjenog protoka krvi. Kada je protok krvi umanjen, slab, on se može lahko zaustaviti u cijelosti ili trenutno vratiti unazad. *U ovoj situaciji kisik ne može biti dostavljen ćelijama i one počinju umirati. Ovo je ključni proces za razumijevanje kako vakcine oštećuju tijelo*
S – Syndrome - sindrom se razlikuje od vrste bolesti, to implicira više uzročnika i više simptoma. Tu ubrajamo poteškoće pri učenju, autizam, alchajmerova bolest, kronova bolest, kolitis, alergija na hranu, sindrom trešenja djeteta, naprasna iznenadna smrt djeteta, šizofrenija, sindrom hroničnog umora, fibromialgija, poremećaj govora, poremećaj pažnje,

tihi ishemijski udari, krvni ugrušci, parkinsonova bolest i mnoge druge moderne bolesti. Sve ove bolesti imaju zajednički mehanizam razvoja.
S – Spectrum – ovo znači da sindrom ima stepene u težini i intenzitetu. Simptomi MASS-a mogu varirati od srednjih do teških. Invalidnost može varirati od neprimjetne do smrti. Sindrom može pogodoti bebe u majčinoj utrobi, novorođenčad, djecu i odrasle svih uzrasta. Izloženost okidačima MASS-a prati spektar. Kod nekih mali okidač izaziva veliki broj onesposobljavajućih simptoma, dok kod nekih velika izloženost može uzrokovati samo minimalne promjene u zdravlju u tom trenutku. Međutim, izloženosti okidačima MASS-a imaju kumulativni efekat. Svaka sljedeća izloženost je teža od one koja joj je prethodila.


Okidači za MASS reakciju

MASS reakcija uključuje prekomjernu stimulaciju imunog sistema, uzrokujući imunološku preosjetljivost. Ovo stanje je najčešće pokrenuto ubacivanjem stranih supstanci u tijelo, koje se inače (da nisu ubačene) nikada ne bi našle u našem tijelu. Vakcine sa svojim virusima, bakterijama, dodacima, konzervansima, i nenamjernim ostacima bioloških zagađivača, ubacaju mnoge strane supstance u tijelo. Cijeli set sastojaka u vakcinama bilo namjerno ili ne, će pokrenuti imuni odgovor. Ovaj imuni odgovor će imati ozbiljne posljedice, koje ugrožavaju zdravlje i život. Vakcine sadrže i ostatke medija koji su korišteni za uzgoj virusa i bakterija kao npr. mrtve ćelije fetusa, ćelije iz organa majmuna, mozga miševa, kao i teleću krv. Vakcine sadrže otrove kao što su lateks,

gluten, soja, monosodium glutamat – MSG, formaldehid i razni konzervansi. Zatim, metali, kao što su živa (thimerosal) i aluminijum su posebno štetni*. Bez obzira na vrstu okidača, odgovor imunog sistema je identičan. Odgovor na tijelu stranu supstancu.* Vidljivi simptomi oštećenja uzrokovani ovom hiperstimulacijom imunog sistema variraju od osobe do osobe. Ove reakcije su klasificirane kao različite moderne bolesti, iako im je uzrok za sve njih isti, a to je hiperstimulacija imunog sistema. Ovo možemo vidjeti i kod neorganskih čestica kao što su azbest, prioni, teški metali i ugljena prašina, svi mogu izazvati bolesti, rak, poremećaje i smrt. Iako nijedan od ovih nabrojanih nisu klice (mikrobi), i infektivne bolesti. Dakle, *MASS je opšti fiziološki odgovor*.

Nebitno da li su agenti u vakcini oslabljeni, mrtvi ili razblaženi prije stavljanja u vakcinu. Ključna stvar je da nešto strano (nepoznato) tijelu biva injektovano u tijelo, i ono reaguje na način razvoja modernih bolesti. Lijek i prevencija ljudskih bolesti, naročito modernih, je pronaći i razumjeti opšti MASS odgovor tijela na ove strane materijale koji ulaze u tijelo.

Zajednička nit modernih bolesti



Dr. Moulden je pokušao ujediniti sve grupe koje rade naporno, da nađu rješenja za njihove specifične bolesti, tako da mogu raditi zajedno da zaustave upotrebu vakcina. On je shvatio da grupa za autizam, grupa za iznenadnu smrt djeteta, grupa za sindrom trešenja djeteta, gardasil grupa, grupa za poremećaj pažnje i sve druge..., svi oni moraju raditi zajedno. Jer, **sve ove bolesti odnosno poremećaji su dio jedne bolesti**. Simptomi bolesti mogu biti različiti, ali mehanizam koji uzrokuje sve ove moderne sindrome i bolesti je *identičan kod svih.* Dr. Moulden kaže: „Vi ste svi dio iste bolesti (kao cjeline). Svi trebate da se borite i idete zajedno, da izmjenite ovaj sistem koji uzrokuje sva ova oštećenja svima vama.“

Bilješke:

[1] "Tolerance Lost," Dr. Andrew Moulden, Video series, Retrieved 12/1/2014. https://www.youtube.com/watch?v=RZXM-TKvLN8

[2] Vaccine Errors, Chapter 2: Where we Went Wrong with Vaccines, Dr. Andrew Moulden, MD PhD; Retrieved 12/9/14. http://barbfeick.com/tolerance_lost/moulden/vaccines-Moulden.html

[3] "Andrew Moulden" RationalWiki, Retrieved 11-04-2014. http://rationalwiki.org/wiki/Andrew_Moulden#Death_and_purported_mental_illness

[4] "Vaccines cause "microvascular strokes" that cause autism?" by Respectful Insolence, Retrieved 11/04/2014. http://scienceblogs.com/insolence/2008/10/16/vaccines-cause-microvascular-strokes-that-cause-autism/

[5] Retrieved 11/05/2014. http://www.drandrewmoulden.com/

[6] IBID.

[7] "Weaponized Mycoplasmas," Dr. Garth L. Nicolson, Lecture presented at the 9th Common Cause Medical Research Foundation Conference,Sudbury, Ontario, Canada on Aug. 29-31, 2008, Published July 29, 2013, Retrieved 10/29/14. https://www.youtube.com/watch?v=sT25HhAVhhU

[8] Vaccine Errors, Chapters 2-4, Andrew Moulden, MD PhD, Retrieved 12/9/14. http://barbfeick.com/tolerance_lost/moulden/vaccines-Moulden.html

[9] "Toxic Vaccines: The Current Science," Presentation given by Leslie Manookian, Weston A. Price Foundation Annual Conference 2014.

[10] "Tolerance Lost," Dr. Andrew Moulden, Video series, Retrieved 12/1/2014. https://www.youtube.com/watch?v=RZXM-TKvLN8

[11] "A Son's Tribute MASS Ischemia Discovered in Eulogy", Dr. Andrew Moulden, Scribd, Retrieved 12/12/2014. https://www.scribd.com/doc/79335431/A-Son-s-Tribute-MASS-Ischemia-Discovered-in-Eulogy

3 Dio

Dr. Andrew Moulden: Svaka vakcina izaziva mikro-vaskularna oštećenja

Dr. Moulden je prepoznao da svaka pojedinačna doza vakcine koja se daje kako bebama tako i odraslima, nanosi mikrovaskularna oštećenja, bilo da je osoba svjesna ili ne te štete, ili ima vidljive simptome u vrijeme primanja vakcine. Kao ljekar i istraživač Moulden je digao veliku javnu pozornost o upotrebi vakcina, zato jer je mogao doslovce vidjeti štetu koju vakcine čine, na izrazima lica kod svojih pacijenata i svih drugih ljudi. Svaka doza vakcine uzrokuje male tzv. mikro udare u mozgu (moždane udare), i drugim organima u tijelu, što donosi visok obim neočekivanih zdravstvenih stanja.

Opozicija alopatskoj medicini

Dr. Moulden je gledao dalje i dublje u uzročnike modernih sindroma i oboljenja. Razvijao je tretmane koji su imali potencijal da liječe moderne bolesti kao: autizam, alchamjerova bolest, poteškoće pri učenju, hronični umor i druge. Njegovi ne-farmaceutski lijekovi su bili jeftini. Ovo je izazvalo farmaceutsku industriju i asocijacije alopatske (konvencionalne) medicine i ljekara da reaguju vrlo žestoko protiv njega i njegovog istraživanja. On je vidio nešto vrlo važno, i dominantni dijelovi zdravstvenog sistema nisu željeli da ljudi saznaju za to.

Zeta potencijal i oštećenja od vakcina

Zeta potencijal je jedan od ključnih mehanizama koje dr. Moulden koristio da objasni proces koji rezultira oštećenjem koje izaziva vakcinacija. Sažeo sam učenje dr. Moulden-a, sa nadom da će se nova generacija ljudi probuditi i shvatiti događanja koju vakcine čine, a to su oštećenja i s tim povezane bolesti.

Fiziologija krvi i vaskularni sistem: razumijevanje kako se razvijaju moderne neurodegenerativne bolesti

Cirkulacija krvi


Krvni sudovi su kao ulice u jednom smjeru. Cjevastog su oblika i krv je namijenjena da teče samo u jednom smjeru. Ona teče od srca kroz velike sudove zvane arterije. Arterije nose krv bogatu kisikom koja je crvene boje. Arterije se dijele iznova do veoma malih. Konačno, one dostižu najmanje sudove, koji se zovu kapilari. Kapilari su tako mali da se ne mogu vidjeti ljudskim okom. Iako čine 95% krvnih sudova u cijelom tijelu, oni sadrže samo 5% cirkularne krvi u datom momentu. Dok je krv u kapilarima, ona daje kisik i skuplja karbon dioksid i ostale otpadne produkte. *Postoji 600 000 milja (šest stotina hiljada) kapilara u ljudskom tijelu.* Kada krv izlazi iz kapilara, ona se skuplja u većim sudovima zvanim vene. Krv je sada plave boje zato jer je predala kisik u kapilarima. Vene idu zajedno i formiraju veće i veće sudove kako nose

Plavu krv prema plućima i srcu. Kada imamo krvni ugrušak ili drugi tip blokade u arteriji ili u kapilaru, onda krv prestaje da se kreće prema toj lokaciji. Rezultat je da se ćelije i tkiva u području gdje je trebao stići kisik kroz krv, počinju gušiti. Sve ćelije traže stalan protok svježe krvi da bi preživjele, u suprotnom umiru.

Ishemija (nedostatak krvi) i udari

Tehnički naziv za nedostatak kisika u grupi ćelija se naziva ishemija. Kada se ishemija desi u mozgu, to se naziva udarom (moždani udar). Udar se može desiti u bilo kojem organu u tijelu, u srcu, bubrezima, jetri crijevima, mozgu, koži, ili bilo gdje u tijelu. Kada je mozak lišen kisika čak i nekoliko minuta, gubimo svijest, i mozak počinje umirati nakon 4 minute.

Vododjelna (watershed) područja mozga i tijela




Ova područja su vrlo sitne sekcije tkiva (grupe ćelija) koji su opskrbljeni samo sa jednim setom krvnih sudova (kapilara). U drugim tkivima i područjima može biti nekoliko grupa krvnih sudova koji donose kisik direktno u ćelije. U ovim područjima sa više izvora kisikom bogate krvi, može biti blokada (udar) jednog krvnog suda, ali sekcija tkiva nije oštećena jer ima alternativne sudove. U vododjelnim područjima gdje ima samo jedan krvni sud, kada dođe do blokade (udara) ćelije počinju umirati, osim, ako se protok krvi ne pokrene ponovo vrlo brzo. U konačnici cijela ova područja mogu odumrijeti. Vododjelna područja mogu doslovce imati krivine u kapilarima gdje krv mijenja pravac kretanja i vraća se prema srcu i plućima. Ovo je slučaj kod prstiju na nogama i rukama, kao i u području oko ušiju i nosa (na vrhovima nosa i

ušiju). Vododjelna područja su ranjiva. Promrzline su česte u ovim područjima jer je krvni protok u kapilarima ovdje vrlo osjetljiv i lahko se uznemiri i poremeti. Primjer oštećenja vododjelnog područja u mozgu je tzv. motorna afazija, koja obuhvata dio mozga koji omogućava proizvodnju govora. Mi ovo zovemo udarom kada se desi starijim osobama. Međutim, ovo isto oštećenje dijela vododjelnog područja mozga, kada se desi kod djeteta se ne naziva udar, nego je označeno kao jedan od simptoma autizma.

Sastav krvi


Da bi razumjeli koncept dr. Moulden-ovog učenja trebamo znati osnovne stvari bazičnih aspekata fiziologije krvi u tijelu. Krv se sastoji od: plazme, crvenih krvnih ćelija, bijelih krvnih ćelija i trombocita.



Plazma- Većina naše krvi je sastavljena od vodene supstance sa električnim nabojem, zvanom plazma. Ovaj električni naboj drži razne ćelije koje plutaju plazmom u stanju da se odbijaju jedne od drugih i plutaju odvojeno.

Laminarni protok krvi – je slobodni protok. Krv koja nema adekvatan električni naboj će imati krvne ćelije unutar sebe koje se grupišu i spajaju zajedno. Grupisanje krvnih ćelija usporava protok krvi i rezultira zgrušavanjem krvi, i laminarni odnosno slobodni protok krvi biva izgubljen.

Crvena krvna zrnca – nose kisik do kapilara i odnose nazad karbon dioskid. Neki od kapilara su tako mali da se crvene krvne ćelije moraju stisnuti da prođu kroz njih. U kapilarima crvene krvne ćelije moraju proći kroz sudove u jednom (pojedinačnom) toku.
Bijela krvna zrnca – su dio imunog sistema, koja imaju zadatak da unište uljeze, patogene, kao što su virusi i bakterije. Duplo su veća od crvenih krvnih zrnaca i ima ih oko 1% u krvi u normalnim okolnostima. Kada je tijelo napadnuto stranim supstancama ili patogenima onda se pušta veliki broj bijelih krvnih zrnaca u krvotok. Kada osoba primi vakcinu, bijela krvna zrnca se puste u krvotok kao dio odgovora imunog sistema na injektiranje stranog materijala u tijelo. Ako ima previše bijelih zrnaca u cirkulaciji, onda one mogu blokirati otvaranje velikog broja najsitnih kapilara koji nisu dovoljno veliki da ih puste da prođu kroz njih. Kada se ovo desi, dotok kisika može biti smanjen do vododjelnih područja.
Trombociti – pomažu zgrušavanju krvi, kada je tijelo povrijeđeno i krv počne isticati. Oni su veličine oko 1/5 crvenih krvnih zrnaca.




Tri historijska mehanizma koja smanjuju normalni protok krvi

Historijski, dr. Rudolf Virchow je nagrađen za otkriće plućnog embolizma ili krvnog ugruška, koji se formira u nožnim venama i ide do pluća, gdje uzrokuje štetu. Njegovo razumijevanje protoka krvi, grušanja krvi i oštećenja samog protoka krvi, je kritično za razumijevanje ljudskih bolesti. Virchow-o tzv. trojstvo kako ga nazivaju, je početna tačka za razumijevanje cijele epidemije neurodegenerativnih oboljenja, koje su posljedica vakcinacije. Dr. Moulden-ov rad je produžetak ovog trojstva. Ishemijski udar je opšti pojam koji označava situaciju gdje potreba za kisikom u krvi nadmašuje opskrbu kisikom u krvi. To se može desiti bilo gdje u tijelu, a ne samo u mozgu.

Kako vakcine i drugi toksini mijenjaju normalni protok krvi

Izmjena normalnog protoka krvi uključuje turbulenciju u protoku, zastoj (smanjen protok naprijed), varikozne vene. Dr. Moulden je otkrio da normalni protok krvi biva izmijenjen vakcinacijama, infektivnim bolestima, toksinima, teškim metalima, dodacima u hrani i lijekovima na koje je osoba preosjetljiva. Smanjen protok krvi se dešava gotovo svaki dan u našim tijelima. Sve dok je ovaj zastoj (grušanje) rezultat normalnog rada tijela, tijelo ima sredstva da otkloni kvarove i krv može teći normalno – glatko.




Oštećenja na unutrašnjem sloju ćelija u krvnim sudovima

Ova oštećenja također uzrokuju smanjenje protoka krvi. Najdublji sloj ćelija u krvnim sudovima se zove vaskularni endotelijum. Ovaj tanki sloj ćelija povezuje sve krvne sudove u cijelom tijelu. Pod mikroskopom, možemo vidjeti da je vaskularni endotelijum sastavljen od sićušnih ćelija koje su čvrsto nabijene zajedno, slično kao krljušt kod ribe. One su poredane jedna do druge i formiraju kompletnu cijev kroz koju krv protiče. Povrede ili traume endotelijuma mogu biti uzrokovane oštećenjem sudova, koje proizilaze iz stresa, hipertenzije, ishemije, toksina, odgovorima imunog sistema na strane supstance koje su u krvi, u tkivu ili u zidovima krvnih sudova. Vakcine mogu uzrokovati oštećenje endotelijuma. Kada je vaskularni endotelijum oštećen, ovo može dovesti do zgrušavanja krvi (ugruška) u tom području.

Zeta potencijal za dobro zdravlje

Slabljenje zeta potencijala u krvi također uzrokuje udare. Zeta je električni naboj koji postoji oko svih čestica u krvi. Negativni naboj uzrokuje da se ove čestice odbijaju u krvi između sebe. Negativni naboj označava dobro zdravlje i suprotno od toga, pozitivni naboj označava narušavanje zdravlja. Kada se električni naboj izmijeni, opadne ili postane neutralan onda se čestice u krvi grupišu. Ovo stvara ugruške i koncentracije čestica. Onda one ne mogu proći kroz male cjevčice koje

su dizajnirane tako da puste samo jednu crvenu krvnu ćeliju, da prođe, u određeno vrijeme.




Kada crvena krvna zrnca počnu gubiti zeta potencijal, one onda počinju formirati tzv. valjak, odnosno one se lijepe i grupišu jedna sa drugom. Rezultat ovoga je udar i hipoksija (smanjen dotok kisika). Valjak je vidljiv pod tzv. *darkfield mikroskopom za obradu žive krvi.* Nažalost, FDA (agencija za hranu i lijekove) je zabranila upotrebu darkfield analize žive krvi za dijagnozu. Ovo znači da oni ne žele da iko uradi komparaciju krvi prije i poslije vakcinacije, i vidi šta vakcine čine unutar naše krvi.

Oštećenje digestivnog sistema ostavlja tijelo u stanju stalne infekcije

Jedan od dijelova tijela koji je teško i jako pogođen smanjenjem zeta potencijala je gastrointestinalni trakt. Smanjenje kapilarnog protoka krvi u digestivnom sistemu izaziva oštećenja, bolesti i brojne anomalije u sistemu. Smanjen protok krvi znači da bijela krvna zrnca ne mogu doći do određenih područja i iskorijeniti viruse i bakterije koje tijelo treba da uništi, kao što su male boginje, rubela i zauške. Ovo ostavlja tijelo u stanju stalne infekcije.

Vakcine su slamka koja lomi grbu kamile kada dođe do oštećenja zeta potencijala



Vakcine sadrže sve u jednom pakovanju, što je potrebno da se oslabi zeta potencijal u krvi, i naprave uslovi u tijelu gdje se onda sve vrste modernih bolesti mogu razviti. Vakcine sadrže kombinaciju infektivnih patogena, aluminijum, živu, dijelove abortiranih fetusa, genetski materijal životinja (majmuna i slično), konzervanse, formaldehid i druge otrovne supstance. Sastojci u vakcinama mogu izazvati oštećenje

protoka krvi, grušanje krvnih ćelija, ishemiju, smrt ćelija, oštećenje rada imunog sistema, bez bilo kojeg drugog uzroka i izlaganja drugim toksinima. *Vakcine sadrže sve što je potrebno da unište normalni protok krvi, liše ćelije kisika, dovedu do smrti ćelija, izazovu štetu svih organa, izazovu neuorološku štetu i dovedu do teških invalidnosti i smrti.*

Aluminijum uništava negativni zeta potencijal

Vakcine izlažu ljude aluminijumu. Akumulacija aluminijuma u tijelu ima vrlo jak štetni efekat na zeta potencijal u krvi. Aluminijum smanjuje zeta potencijal kako starimo, 4ppm (4 dijela na milion) aluminijuma u ljudskoj krvi može uzrokovati zgrušavanje krvi. Prema tome, vakcinisanje starijih osoba, ili onih sa zgrušanom krvi može smanjiti zeta potencijal do tačke gdje i emocionalni stres može izazvati mikrovaskularno začepljenje u mozgu (udar), ili srčani udar. Ponavljano izlaganje vakcinama i toksinima će vremenom sniziti negativni zeta naboj prema pozitivnom. Svaki put kad primite vakcinu ona smanji negativni zeta potencijal. Možda jedna doza vakcine neće odmah izazvati vidljivu štetu, sve dok negativni zeta potencijal ostane visok. Ali aluminijum se taloži u tijelu i nije ga lahko izlučiti, što znači da aluminijum iz vakcina nastavlja ukidati zeta potencijal do tačke gdje nastaje oštećenje. Šteta koju uzrokuju vakcine nije predvidljiva. Mi ne znamo koliku štetu će svaka doza vakcine napraviti na zeta potencijal. Ono što sigurno znamo je da je aluminijum iz vakcina snažan agent, koji povlači zeta potencijal u krvi sa negativnog prema neutralnom naboju.

Bilješke:

[1] “Understanding Colloidal Suspensions,” Frank Hartman & Thomas Riddick, Retrieved 12/15/2014. http://customers.hbci.com/~wenonah/info/colloid.htm

[2] “Vaccination / Infection / Toxicity,” by Dr. Frank Hartman, Webpage: Vaccination Hazards – Nanobacteria + some additives in vaccines are extremely harmful, Published 2002, Chart: “Control of Colloidal Stability through Zeta Potential,” from Thomas Riddick, Retrieved 12/15/14. http://customers.hbci.com/~wenonah/riddick/vaccine.htm

3] “Al = Aluminum – a Toxic Element – Linked to many diseases in humans,” Dr. Frank Hartman, Retrieved 12/12/2014. http://customers.hbci.com/~wenonah/hydro/al.htm#toxic

4. Dio

Novo medicinsko otkriće dr. Andrew Moulden-a

Dr. Andrew Moulden se usudio izjaviti da teorija klica (zastupljena teorija u medicini) u izazivanju bolesti i genetsko nasljeđe ne mogu objasniti uzroke prave epidemije tzv. modernih bolesti. Jedan od faktora, pored vakcina i ostalih toksina, koji utiču na razvoj bolesti je stanje samog tijela, zatim ishrana, kao i crijevna flora, koji određuju da li će reakcija na vakcine i toksine biti minimalna, srednja ili teška. Naravno, klice (mikrobi) su uključene u određene bolesti, ali klice nisu direktni uzrok bolesti. One radije *izazivaju reakciju u tijelu* koja dovodi do bolesti. Reakcija tijela je centar dr. Moulden-ovog modela bolesti. Moderni proizvođači lijekova (droga) fokusiraju se samo na gentesko naslijeđe. Fabrike lijekova kao i hemijske fabrike, se sada okreću ka genetskim anomalijama da objasne zašto ljudi obolijevaju. Oni žele da mi vjerujemo, da nisu njihovi otrovni produkti ti koji oštećuju ljude, nego naš genetski materijal. Njihovi produkti nisu problem, mi smo problem.

MASS odgovor ne slijedi klasične korake zgrušavanja krvi

Šteta nastala od MASS reakcije je prolazna, povratna i kumulativna. MASS proces je klinički tih i neprimjetan, sve dok se veća šteta ne pojavi. MASS izaziva hipoksiju (nizak nivo kisika), anoksiju (stanje bez kisika), ishemiju (malo kisika zbog smanjenog protoka krvi) i udare

(potreba za kisikom prekoračuje raspoloživi kisik). Ovi tipovi reakcija uzrokuju ljudske bolesti. Tu spadaju hronična oboljenja, poremećaji, smrt, vakcinama proizveden sindrom autizma, iznenadnu smrt djeteta, kao i bolesti mnogih drugih organa i njihovih disfunkcija.

Vakcine izazivaju MASS reakciju uzrokujući brojne neurodegenerativne bolesti

MASS je opšti fiziološki odgovor tijela. Nije važno da li su infektivni agenti u vakcini oslabljeni, ubijeni ili razblaženi prije nego su ubrizgani u tijelo. Ključno je to da nešto strano tijelu, biva injektovano u tijelo, i naše tijelo reagira na način na koji nastaju neurodegenerativna oboljenja. MASS je normalan proces, tačnije dio procesa izliječenja tijela. Razlog zašto MASS uzrokuje moderne bolesti je zato što zarazni organizmi i otrovne supstance izazivaju prekomjernu stimulaciju našeg imunog sistema.

MASS reakcija se neće uvijek desiti odmah nakon vakcinisanja



Mnogi ljekari odbijaju da prihvate štetne reakcije na vakcine, čak i kad se dogode samo nekoliko sati poslije primljene vakcine. Međutim, ove rekacije na vakcine se mogu javiti nekoliko sedmica, mjeseci ili čak godinama kasnije. Sindrom naprasne smrti djeteta (SIDS) je posljedica MASS reakcije. Sada znamo da 70% djece koja umre od SIDS-a, umire kroz 3 sedmice nakon primanja pertusis vakcine. Dr. Moulden je objasnio slučaj antraks vakcine, da žene koje prime ovu vakcinu bivaju upozorene da je opasno da zatrudne dok ne prođe 18 mjeseci od primanja doze antraks vakcine. Ako ne poslušaju ovo upozorenje, njihova djeca u suprotnom mogu biti rođena bez ruku i nogu. Postoje i reakcije na koži uzrokovane aluminijumom, i to na strani tijela gdje je primljena vakcina. Ove reakcije se mogu javiti odmah nakon primanja vakcine i nastaviti kroz sedam ili osam godina poslije. U nekim slučajevima reakcije na koži se javljaju od jedne do šest godina poslije.

Aluminijum je izdržljiv u tijelu, teško se izlučuje, i izaziva reakcije još mnogo vremena kasnije nakon primljene vakcine.

Aluminijum je jedan od najopasnijih faktora koji dovodi do MASS rekacije



Upotreba aluminijskih soli da se vakcina stabilizuje, pogoršava efekat vakcine višestruko i do 6000 puta. Aluminijum je jedan od najmoćnijih agenata za stimulaciju MASS reakcije. Dr. Hartman, istraživač na polju odnosa zeta i aluminijuma objašnjava zašto se on koristi tako slobodno. On kaže: „Aluminijum je izuzet iz testiranja na sigurnost od strane FDA i klasificiran kao generalno siguran. Nikad nije testiran od FDA, i ne postoje ograničenja na količinu i upotrebu aluminijuma.“ Toksičnost aluminijuma je široka i obuhvata sve oblike života, uključujući ljude, životinje, ribe, biljke i drveće, i uzrokuje široku degradaciju okoliša i zdravlja. Postoji oko milion referentnih članaka koji govore o njegovoj

toksičnosti. Postoji oko 2000 referenci u nacionalnoj biblioteci medicine o štetnosti aluminijuma. Toksičnost aluminijuma je prepoznata u mnogim okolnostima gdje je izloženost bila teška (akutna) ili pak slabija ali prolongirana na duže vrijeme. Toksičnost uključuje: encelofatija (mucanje, poremećaj hoda, napadi, trzaji mišića, koma), osteomalacija ili omekšavanje kostiju, propadanje mišića, spontani lomovi kostiju, iznenadna smrt, povećan rizik od infekcija.

Bilješke:

[1] Miller, Neil Z, and Goldman, Gary S; “Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?” Hum Exp Toxicol. September 2011, PMCID: PMC3170075.

[2] Vaccine Safety: Forward, Russell Blaylock, MD, Retrieved from Scribd on 12/12/2014. https://www.scribd.com/doc/11564541/CH-5-1-Vaccine-saftey-forward

[3] “Vaccination Hazards – Nanobacteria + some additives in vaccines are extremely harmful,” Dr. Frank Hartman, Retrieved 12/12/2014. http://customers.hbci.com/~wenonah/riddick/vaccine.htm

[4] “Al = Aluminum – a Toxic Element – Linked to many diseases in humans,” Dr. Frank Hartman, Retrieved 12/12/2014. http://customers.hbci.com/~wenonah/hydro/al.htm#toxic

[5] “Al = Aluminum – a Toxic Element – Linked to many diseases in humans,” Frank Hartman, Retrieved 12/12/2014. http://customers.hbci.com/~wenonah/hydro/al.htm#toxic

5 Dio

Učenje prepoznavanja oštećenja uzrokovanih vakcinama

Dr. Andrew Moulden je želio da svaki roditelj na ovom svijetu sazna o štetnim efektima vakcinacije. On je živio u nadi, da bi svako odbacio upotrebu vakcina, nakon istraživanja dokaza o šteti koju uzrokuju našem tijelu. Bez obzira kakav je vaš trenutni pogled na upotrebu vakcina, informacije u ovom poglavlju će vam otvoriti oči. Jednom kada naučite kako pronaći simptome štete koju su vakcine napravile na licima djece i odraslih, vaš život više nikada neće biti isti. Osjećati ćete se kao i dr. Moulden, gledat ćete u lica dječaka i djevojčica i vidjeti nepobitne dokaze oštećenja koje su vakcine uzrokovale. Žaliti ćete i tugovati za životima mnogih koji su oštećeni.

Istraživanje dr. Moulden-a: sve vakcine uzrokuju neka oštećenja


Dr. Moulden je imao namjeru da objasni štetu koja proizilazi od upotrebe ne samo nekih, nego svih vakcina. Možda i najveći dio njegovog naslijeđa je sistem koji je koristio da nadgleda i procijeni rane faze oštećenja uzrokovanih vakcinama. Mnogi roditelji su prestali sa vakcinisanjem, bez potrebe da im se dokazuje štetnost. Drugi roditelji su ipak počeli sa ispitivanjem štetnosti vakcina, nakon što su vidjeli

simptome bolesti i disfunkcije kod svoje djece. Dr. Moulden je istraživao i tretmane koji će vratiti zdravlje oštećenoj djeci. Politički pritisak kanadskog kolegija ljekara uspio ga je ušutkati prije nego je podijelio i objavio video o detaljnom tretmanu u liječenju oštećenja uzrokovanih vakcinama.

Vododjelna područja: vakcine oštećuju nerve koji mijenjaju izraz lica

Vododjelna područja su vrlo sitna područja tkiva, odnosno grupe ćelija, koja imaju samo jedan krvni sud koji dostavlja krv u kapilarni tok. Kapilari su tako mali da se mogu vidjeti jedino pod mikroskopom. Tako su sitni da se crvene krvne ćelije moraju stisnuti kada prolaze kroz kapilarni krvotok. Vododjelna područja su vrlo osjetljiva zato što nemaju sporedni kapilarni protok krvi. Tako, kada krvotok stane kroz ove pojedinačne sudove (puteve), zbog ugruška, blokade od bijelih krvnih ćelija ili zbog upale krvnog suda, tada nastaje oštećenje u ćelijama koje se nalaze u ovom području. Ćelije se guše i umiru zbog nedostatka kisika. Šteta u ovim područjima može biti privremena, u trajanju dan ili dva, ali i trajna. Mi možda nismo ni svjesni oštećenja nastalih u ovim područjima, ali šteta postaje sasvim očigledna kada uključuje određene kranijalne nerve, koji idu iz mozga i aktiviraju mišiće koji se nalaze na licu. Oštećenje ovih nerava mijenja izraz na licu na načine koji jedino mogu biti uzrokovani oštećenjem kranijalnih nerava.

Oštećenje kranijalnog nerva, usta padaju, udar.



Oštećenja kranijalnih nerava u vododjelnim područjima

Postoji dvanaest (12) kranijalnih nerava. Četiri (4) od njih pokazuju vidljiv dokaz oštećenja vododjelnih područja. To su treći, četvrti, šesti i sedmi kranijalni nerv. Ovi nervi sadrže vododjelna područja koja se lahko oštete kada je smanjen protok krvi kroz njih ili je protok prekinut. Šteta koja nastane zbog nedostatka kisika, može biti vidljiva na dijelovima ljudskog lica, koji su kontrolisani od strane trećeg, četvrtog, šestog i sedmog kranijalnog nerva. U većini slučajeva šteta nastane u smislu da se nervi oslabe i ograniči njihova sposobnost da kontrolišu određene mišiće lica. Neće obično nastupiti kompletna paraliza, koja će rezultirati kompletnim gubitkom mišića. Umjesto toga, nastupit će oslabljena mogućnost korištenja mišića, ili oslabljenost mišića da reaguje dovoljno brzo.

Slika ispod:




Figure 2-4: The action and nerve supply of the extraocular muscles.

Paraliza – slabost mišića uzrokovana oštećenjem nerava

Paraliza odnosno oduzetost je najčešće vidljiva na jednoj ili drugoj strani lica, što je dobro vidljivo za onog koji zna kako posmatrati izraze lica. Ako su uključena usta, onda jedna ivica usta (ugao) izgleda kao nagnuta prema dolje, u poređenju sa drugom koja je normalna. Ako paraliza pogodi oči, onda imamo lagano različitu ravan kod pokretanja i pri pogledu očiju, zato što su mišići koji pokreću jedno oko slabiji od mišića drugog oka koje nije pogođeno oštećenjem. Ponekad će jedno

oko biti neusklađeno sa drugim, i izgledat će kao okrenuto prema gore ili dole. Treptanje očnih kapaka može biti neravnomjerno, pri otvaranju i zatvaranju. Svi ovi simptomi su pokazatelji neurološkog oštećenja kranijalnih nerava. Kada je protok krvi blokiran i prekinuta opskrba kisikom do bilo kojeg dijela nerva, onda se desi paraliza. Nervne staze (putanje) idu od vrha mozga od motornih područja prema niže. One prolaze kroz srednji dio mozga i idu prema licu gdje kontrolišu mišiće lica. Ako postoji nedostatak opskrbe krvlju bilo kojeg dijela nervnog puta, onda će pristup nervnom sistemu u ovo područje biti izgubljen i mišići lica će biti oštećeni. Oštećenje može varirati od slabog i suptilnog, do teške paralize. Može biti akutno, gdje se nerv oporavi nakon nekog vremena i vrati mu se normalna funkcija, ili može biti permanentno odnosno trajno.



Udar – dokaz u mišićima lica

Paraliza u licu je dokaz udara koji se događa u mozgu. Kada je udar privremen, on se zove „TIA“ (Transient Ishemic Attack). Transient znači privremeni, Ishemic označava nedostatak kisika, Attack je udar. TIA može uzrokovati kliničke simptome kada se blokada krvi desi na kritičnoj lokaciji mozga, inače se ona dešava neprimjetno. Ova privremena blokada se obično popravi u roku od 24 do 48 sati. Čak, i ako ima kratko trajanje, ona je još uvijek moždani udar. Klasični primjer udara uključuje: potpunu paralizu polovice tijela, pad ivice usta (zakrenutost usta), utrnulost lica, gubitak govora, jedno od očiju se okrene unutra prema nosu.

Oporavak od paralize i udara

Postoji mnogo zajedničkih simptoma kod modernih neurodegenerativnih bolesti, ali postoje razlike u stepenu invalidnosti i obimu oporavka. Neka djeca i bebe će se oporaviti potpuno, neka će vratiti srednju funkcionalnost, neka će se oporaviti veoma malo. Neki će povratiti mogućnost govora, dok drugi neće moći nikako govoriti. Neki imaju senzorne probleme, neki nemaju. Neki imaju psihoze, druge ne. Ukupan obim ponašanja, društvenih sposobnosti, emocionalnih procesa, saznanja, pamćenja, namjera, sve ovo može biti oštećeno udarima. Oštećenja mogu varirati, od najmanjih do teških u mnogim dijelovima tijela. Otkrivanje udara sa tehnologijom snimanja (skeniranja) nije uvijek moguće. Čak i kad postoje udari u malim

arterijama koji vode do kapilara, blokade mogu ostati neprimijećene. Zbog toga, umjesto korištenja visoko-tehnoloških instrumenata za dijagnozu dokaza mikrovaskularnih udara, moramo koristiti naše oči, da vidimo posljedice udara koji se javljaju i manifestuju na pokretima ljudskog lica. Sve je vidljivo, ako znate šta da gledate i da pravilnim i pažljivim posmatranjem prepoznate posljedice udara.

Vizuelni (očevidni) dokaz oštećenja sedmog kranijalnog nerva



Sedmi kranijalni nerv primarno kontroliše donju polovicu lica. Paraliza ovog nerva uzrokuje slabost u uglovima (ivicama) usta. Jedan ugao usta će imati lagani pad naniže, prema dolje. Ovo postaje veoma vidljivo

kada se osoba nasmije. Kod normalnog osmijeha vidimo oba ugla usta podignuta naviše. Dakle, kada imamo paralizu sedmog kranijalnog nerva, jedan ugao usta se neće moći podići u skladu sa drugim. Također može se javiti gubitak bora (naboranosti) na vrhu glave, čelu, i može doći do poremećaja intenziteta u treptanju očnih kapaka. Ova oštećenja koja se javljaju kao rezultat nefunkcionalnosti sedmog kranijalnog nerva obično se dešavaju bez vidljivih tragova na medicinskim pretragama (skenerima). CT, MRI skeneri, angiogram i bilo koji drugi alat koji je bio u upotrebi 2009 godine (vrijeme pisanja ovog teksta), ne može snimiti udare na mikrovaskularnom nivou kao što su kapilari. Kapilari su veličine, pa čak i manji od crvenih krvnih zrnaca. Ako uzmete jedan red crvenih krvnih zrnaca i razvučete ih preko vrha igle, onda će vam trebati oko *133 ili više crvenih krvnih zrnaca da pređete od jednog vrha igle do drugog*. Ako je stanje ovako, onda ne možete vidjeti linije, redove crvenih krvnih zrnaca, jer su daleko manje od bilo čega drugog što bi bilo vidljivo pod mikroskopom. Crvena krvna zrnca su raspona od 6-8 mikrona u širini. Mikron ili mikrometar je milioniti dio metra. *Zapamtite, neki kapilari su toliko mali da i crvena krvna zrnca moraju da se stisnu da prođu kroz njih.*

Gubitak simetrije u licu je pokazatelj moždanog udara

Ako odrasli čovjek ili žena, odjednom, danas primijete pad jednog ugla usta, a nije ga bilo jučer, onda je to jasan pokazatelj udara u mozgu, i to oštećenja sedmog kranijalnog nerva. Neurolozi, porodični ljekari i drugi doktori su svi istrenirani da prepoznaju ovu vrstu simptoma. Kada zapaze ove simptome, osobu odmah hospitaliziraju, jer joj je potreban tretman, doživjela je moždani udar. Ali, zašto je ovaj isti simptom udara ignorisan kada se desi kod djece? Ako se ova reakcija dogodi djetetu poslije primljene vakcine, onda je razumno pretpostaviti da je vakcina uzročnik udara. Međutim, doktori izgleda ne primjećuju (ili ne žele da primijete) takve simptome kada se dešavaju kod djece.

Klonulost lica: uobičajeno kod autizma

Sedmi kranijalni nerv pored kontrole uglova usta, još kontroliše područje obraza, između ivice nosa i gornje usne. Ovo područje postaje ravno. Prirodno zaobljeni nagib obraza biva izgubljen. Obim i tonus nestaju na jednoj strani, na drugoj ostaju normalni. Ovo se također zove tzv. klonulost (obamrlost) lica. Strane lica se ne pomjeraju više simetrično odnosno ujednačeno. Ovu vrstu simptoma često vidimo kod djece sa autizmom.



Dakle, da zaključimo, kada god imamo pad ivice usta ili poravnanje nosnih i usnih nagiba i tih područja, to nam ukazuje na oštećenje sedmog kranijalnog nerva, i da je u toku moždani udar. Ovaj znak udara ne govori nam o stepenu oštećenja. To je samo znak da se udar dogodio. *Lice je prozor u mozak i cijelo tijelo* – to je pokazatelj šta se dešava u kompletnom protoku krvi u čitavom tijelu.

Lokalna i sistemska oštećenja u tijelu

Kada ustanovimo da je sedmi kranijalni nerv oštećen, možemo biti sigurni da šteta nije izolovana samo na sedmi kranijalni nerv, šteta se dešava svugdje u tijelu. Krv postaje zgrušana u mnogim područjima u tijelu, što uzrokuje ishemiju, oštećenje tkiva, funkcionalne poremećaje i bolesti. Ovo nije genetski, ovo je stečeno! Pad ivice usta (zakrivljenost usta) je rezultat niskog negativnog naboja u krvi tj. zeta potencijala i MASS procesa koji se odvijaju u tijelu. Ljudi sa autizmom, neurodegenerativnim poremećajima, ADHD, i oni koji su imali štetne reakcije od vakcina, kao vakcine protiv hepatitisa B, Gripa, antraksa,

gardasil, MMR, DPT, isl., su imali isti, tzv. osnovni odgovor. *Tijelo reaguje na ubacivanje strane materije u njega.*

Oštećenje šestog, četvrtog, i trećeg kranijalnog nerva




Postoje tri kranijalna nerva koji kontrolišu pokrete očiju. Oni kontrolišu grupu mišića koji pokreću oči, desno i lijevo, gore i dole, i dijagonalno.

Šesti i treći kranijalni nerv

Šesti kranijalni nerv kontroliše mišiće na vanjskim uglovima oba oka. Treći kranijalni nerv kontroliše mišiće unutrašnjih uglova očiju prema nosu. Zajedno ova dva nerva pokreću mišiće na kretanje očiju lijevo i desno. Oba ova nerva moraju raditi zajedno da bi pokretali oči. Ako osoba gleda u desno, onda šesti nerv na vanjskoj strani desnog oka govori mišićima da pomjere to oko nadesno. U isto vrijeme dok se ovo dešava, treći kranijalni nerv uzrokuje odnosno pomjera mišiće u unutrašnjem uglu lijevog oka da pomjeri lijevo oko u desnu stranu.

Zajednički prvi znak oštećenja vakcinama

Paraliza mišića očiju koje kontroliše šesti kranijalni nerv je često prvi znak oštećenja koje uzrokuju vakcine. Važno je shvatiti da je šesti kranijalni nerv smješten u vaskularnom tzv. vododjelnom području u moždanom stablu. Ovo znači, da ako je protok krvi smanjen kroz moždano stablo iz bazalne arterije, onda će se sudovi koji su najudaljeniji od tog izvora protoka krvi, prvi osušiti. Kao i kod korita rijeke tokom suše, najudaljeniji dijelovi korita se prvo suše kad rijeka presušuje. Oštećenje može nastati kroz nekoliko sati ili pak dana poslije primanja vakcine.



Kada je oštećen šesti kranijalni nerv, onda nastupa paraliza vanjskog dijela oka (prema slijepoočnicama). Ovo će uzrokovati da mišići na toj strani oka postanu previše opušteni odnosno oslabe. Ovo će onda omogućiti mišićima koje kontroliše treći kranijalni nerv, da gurnu oko lagano prema unutra, prema nosu, u poređenju sa drugim okom koje nije pogođeno oštećenjem. Tako da oko biva povučeno unutra prema nosu.

Oštećenje opasno po život u području šestog kranijalnog nerva – iznenadna smrt bebe poslije izlaganja vackinaciji

Mnogo ozbiljnije oštećenje nastaje kada paraliza obuhvati vanjski ugao oba oka. U ovoj situaciji slabost oba oka, njihovog vanjskog dijela, uzrokuje da oči ostanu u neravnim položajima. Oba oka idu prema unutra – prema nosu. Ovo znači da je paraliza obuhvatila šesti kranijalni

nerv na obje strane lica. Nedostatak kisika se dešava bez bola, odnosno tiho, neprimjetno. Poremećaji u normalnim pokretima očiju su suptilan neuorološki znak procesa nastanka štete. U slučajevima iznenadne smrti djeteta (tzv. SIDS), primjetili smo da su kontrole za lijeve i desne pokrete oka upravo pored centra u moždanom stablu koji kontroliše automatsko disanje. Ovo područje mozga, ovaj centar govori našim plućima da dišu. Kada udar pogodi ovo područje, može početi tiho sa jednim okom okrenutim unutra.



Ako se ograničenje protoka krvi u ove sitne dijelove mozga nastavi i proširi na oba oka, i blokada dalje nastavi prema centru za disanje, onda nastupa iznenadna smrt. Ponekad se smrt ovog tipa može desiti tokom spavanja, bez neuroloških karakteristika, kada nastupi udar u sitnim kapilarima u respiratornom centru. Udar šestog kranijalnog nerva može biti ozbiljno upozorenje o mogućnosti nastupa iznenadne smrti djeteta ili odraslih bilo koje dobi. Važan slučaj koji pokazuje ovaj obrazac prestanka disanja je viđen kod bebe koja je postala ozbiljno bolesna nakon 24 sata po primanju MMR vakcine. Roditelji su primjetili da ima ozbiljan problem. Stanje bebe se nastavilo pogoršavati i nakon nekoliko

posjeta doktoru. Beba je hospitalizirana, jer je imala napade. Poslije toga je pala u stanje gdje joj je otkazalo disanje. Stavljena je na respirator koji je držao u životu. Doktori su uradili cerebralnu perfuziju, snimanje, da ispitaju protok krvi u mozgu. Snimak je pokazao normalne vitalne znakove, normalan krvni pritisak, normalan rad srca, itd. Međutim, nije bilo protoka krvi kroz mozak. Kada se protok krvi ne može desiti u mozgu, odnosno kada je protok krvi zaustavljen kroz mozak, funkcionalnost moždanog stabla je uništena. Ovo sprečava osobu da ostane u stanju budnosti i svjesnosti, i uništava dio mozga za disanje, odnosno centar za automatsko disanje, koji će na kraju u konačnici dovesti do smrti. Porodica i doktori su gledali kako beba polahko umire dok respirator diše za nju. Ustvari mozak ove bebe je prolazio kroz faze iznenadne smrti bebe nakon primanja vakcine.

Četvrti kranijalni nerv – vertikalni pogled kod povrijeđenih vakcinama i gulf war veterani

Četvrti kranijalni nerv kontroliše pokrete očiju kada gledaju prema dolje i prema gore. Ovaj nerv se aktivira kada gledamo prema podu ulijevo ili udesno. Ako je četvri kranijalni nerv oštećen na jednoj strani, onda oko neće gledati pravo naprijed, simetrično sa drugim okom. Ovo se naziva vertikalni pogled. On se može vidjeti kod djece oštećene vakcinama, kao i kod nekih vetarana zaljevskog rata (gulf war veterani).



Ove osobe često naginju svoju glavu prema naprijed da izravnaju oči u istu ravan, odnosno kompenziranju neravnine u pogledu. Ako ovo ne urade, ove osobe mogu imati dvostruku sliku pri pogledu. Dakle, na ovaj način oni kompenzuju nastalo oštećenje.

Testiranje oštećenja kranijalnih nerava

Posmatranje pokretanja očiju – pogled ulijevo pa udesno, pa onda gore pa dolje. Ovako moramo pokrenuti sve nerve (njih tri) koji kontrolišu kretanje očiju. Ponekad je vidljiva neujednačenost očiju kada posmatramo oči sprijeda dok one miruju. U drugim situacijama paraliza postaje vidljiva kad se oči pomjeraju. Ponekad je teško vidjeti da jedno oko kasni za drugim. Video snimanje u ovim situacijama je neophodno, jer ono otkrije paralizu, gledanjem usporenog snimka pokretanja očiju. Mnogo će pomoći snimanje video sadržaja prije i poslije vakcinacije. Ovi snimci i slike brzo otkriju razliku u izrazu lica i očnim pokretima.

Procjenjivanje oštećenja posmatranjem treptanja očnih kapaka

Posmatranje promjena u aktivnosti treptanja očnih kapaka je novi način ispitivanja znakova neuroloških oštećenja. Kada imamo paralizu jednog od kranijalnih nerava koji kontroliše pokrete očnih kapaka, onda otvaranje i zatvaranje kapaka neće biti ujednačeno. Jedan očni kapak će kasniti za drugim kada se pokreću pri treptanju. Kapci trepću ekstremno brzo i nije moguće procijeniti njihove pokrete sa samim posmatranjem. Da bi otkrili nepravilnosti, moramo snimiti video treptanja očnih kapaka, i pustiti video snimak veoma sporo dio po dio, procijenjujući i posmatrajući pokrete očnih kapaka pažljivo. Ako imamo paralizu petog i sedmog kranijalnog nerva, onda očni kapak koji kasni pri treptanju, je strana koja je pogođena paralizom. Ovaj test ne može biti lažan. Možemo treptati kada hoćemo svojom voljom, ali ne možemo voljno uzrokovati različitu stopu pokreta kapaka pri nesvjesnom treptanju koje traje 1/3 sekunde ili manje. Različit stepen nesvjesnog treptanja očnih kapaka je fiziološki i klinički znak da se dešava ishemija, od MASS reakcije i zeta potencijala koji slabi. Jednom kada je oštećen protok krvi i opskrba krvlju smanjena, onda je osoba individualno osjetljiva na bilo šta što će uzrokovati buduću hiperstimulaciju imunog sistema ili smanjiti zeta potencijal krvi. Svako sljedeće izlaganje vackini ili toksinima će uzrokovati veću MASS reakciju i veći gubitak zeta potencijala. Ako je paraliza nerava koji kontrolišu treptanje očnih kapaka značajna, onda osoba neće moći zatvoriti nikako jedan od očnih kapaka.

Preporuke za liječenje oštećenja od vakcina

Prije svega, prva preporuka je prestanak upotrebe vakcina, i izbacivanje unesenih - injektovanih stranih supstanci iz tijela. Zatim, čist zrak, čista voda i čista hrana. Voda mora biti čista, voda iz gradskog vodovoda koja sadrži hlor, fluor, ostatke lijekova, poljoprivredne hemikalije isl., nije sigurna i ona je pokretač mikrovaskularnih udara. Prokuhana voda iz plastičnih boca je nesigurna. Hrana koja sadrži pesticide, konzervanse, vještačke boje i arome, MSG (monosodium glutamat – pojačivak okusa), GMO hrana, hormoni i druge otrovne supstance mora biti izbjegavana. Živa iz hrane, amalgamskih (srebrnih i crnih plombi) i iz vakcina mora biti izbjegavana i uklonjena. Preporuka je jesti živu, sirovu nekuhanu hranu i zelenilo svih vrsta. Zelenilo sadrži u sebi hlorofil, koji se još naziva i krv biljaka. Hlorofil je vrlo sličan našoj krvi, struktura mu je identična kao kod naše krvi, s jednom razlikom u sredini strukture molekule naše krvi nalazi željezo, dok se kod hlorofila nalazi magnezijum. (slika ispod). Ishrana igra vrlo važnu ulogu u stepenu sa kojim osoba može da se nosi sa otrovima koji ulaze u tijelo.

PLANT CHLOROPHYLL
MAGNESIUM AT THE CENTER

HUMAN BLOOD HEMOGLOBIN
IRON AT THE CENTER

Sličnost hlorofila iz zelenih biljaka sa našom krvi

Zaključak: Dr. Moulden-ov rad mora biti izučavan i nastavljen da bi razumjeli štetu koju vackine nanose našem tijelu

Dr. Andrew Moulden je bio posvećen otkrivanju istine o bolestima i smrti koju uzrokuju vakcine. Nema sumnje da vakcine uzrokuju štetu svakome ko ih koristi. Dr. Moulden-ovo istraživanje zeta potencijala u krvi i MASS reakcija otkriva mehanizme kroz koje se dešava šteta u našem tijelu. Dr. Moulden je pokazao blisku povezanost između širokog raspona modernih neurodegenerativnih bolesti, odnosno, da su sve te bolesti spojene i povezane sa istim ili sličnim simptomima. Ove moderne bolesti nisu uzrokovane genetičkim naslijeđem ili patogenima i virusima. Ove bolesti su uzrokovane normalnom reakcijom tijela na

strane supstance koje su unijete u tijelo. Ova reakcija je nazvana prekomjerna nespecifična imuna hiperstimulacija. Vakcine su jedan od najvećih okidača ove reakcije, koja na kraju vodi do zgrušavanja krvi, ugrušaka, ishemije i gubitka zeta potencijala (negativnog naboja u našoj krvi). Kombinovani efekat svih ovih faktora proizvodi bolesti, invalidnost i smrt.

Pri obradi ovih tekstova i ove cijele knjige, moja želja i nada jeste ta da će drugi doktori i drugi istraživači biti inspirisani da ozbiljno razmotre rad dr. Moulden-a i nastave tamo gdje je on stao. Nadam se da će roditelji ozbiljno razmotriti opasnost upotrebe vakcina za svoju djecu i sačuvati i isključiti sebe i svoju djecu od daljnje upotrebe vakcina. Nadam se da ćemo početi u budućnosti više cijeniti ljudski život u takvom obimu, da ćemo postupati sa velikim oprezom kada razmatramo upotrebu bioloških i hemijskih izmišljotina da spriječimo i liječimo bolesti. Ljudsko tijelo nije mašina koja može biti podešena da zadovolji standarde ljudskih inžinjera. Ljudski život nije program koji može biti podešen po volji finansijskih potreba korporacija. Ljudski život i tijelo je Božija kreacija, i kao takav, zahtijeva veliku brigu i zaštitu od onoga što čovjek sa svojom pohlepom i moći pokušava da mu uradi. Dr. Moulden je bio posvećen ka istini u svom životnom istraživanju. Možemo li pažljivo razlučiti razliku između informacija koje donose medicinske marketinške firme, i istinskih principa koji održavaju ljudski život. Možemo li odbaciti medicinski sistem koji je upravljan i održavan na strahu od bolesti, i koji je organizovan da pravi novac na račun ljudske patnje.

Bilješke:

[1] “Baby M’s Parents-Vaccine Death Forensics Report,” Vaccine Facts, Retrieved 12/26/14. http://www.vacfacts.info/baby-ms-parents-vaccine-death-forensics-report.html